2009

EWH BioProduction ApS
Centervej Syd 4
4733 Tappernøje
Telefon: 45 55 96 00 21
Fax: 45 55 96 00 31
Email: Bio@bioproduction.dk

Bestil gerne varer, se vores udvalg af biologiske bekæmpelsesmidler, eller læs vejledninger på:
www.bioproduction.dk

Biologisk bekæmpelse af spindemider

Spindemiden, som gerne angriber agurker, tomater, peber, potteplanter, jordbær og hindbær, har en naturlig fjende i spindemiderovmiden **'Biofyto'**.

Spindemiderovmiden **'Biofyto'** er meget effektiv til at bekæmpe skadedyret.



Spindemide, Tetranychus urticae

Høj luftfugtighed hjælper rovmiderne

Det er en stor fordel for bekæmpelsen, hvis spindemideangrebet opdages i tide, så et tilstrækkeligt antal rovmider kan sættes ud på planterne straks efter angrebet er konstateret. Hvis der allerede er for mange spindemider - spind og gule blade - må det anbefales at fjerne de værst angrebne planter, og behandle med insektsæbe et til to døgn før rovmiderne sættes ud.
Temperaturen skal helst være over 20 grader i minimum 8-12 timer af dagen. Ved temperaturer omkring 25 grader kan der opnås en meget vellykket bekæmpelse. Høj luftfugtighed (over 60 procent) fremmer rovmidernes formering. Rigelig vanding eller vandforstøvning en til to gange om dagen, mens bekæmpelsen står på, er derfor en fordel. BioProduction anbefaler at potteplanter, væksthusgrøntsager samt jordbær i væksthus får en forebyggende behandling med en til to rovmider/m2 hver 14.dag. Hvis planterne er angrebet, anbefales mindst 10 til 20 rovmider /m2.

Jordbær på friland

Til jordbær på friland gives forebyggende 5.000-10.000/ha spindmiderovmider ('Biofyto') i juli måned. Til behandling gives 20.000-60.000/ha afhængig af angrebsgrad.
'Biofyto' skal have mindst seks uger med gennemsnitstemperatur over 20 grader for at opnå god effekt. Ved 25 grader formerer rovmiderne sig hurtigere end spindemiderne. Den kurative behandling kan gentages efter to til tre uger indtil der er sikkerhed for at bekæmpelsen er vellykket
Vær opmærksom på, at der senere på sæsonen kan komme spindemider igen, fordi rovmiderne æder hinanden og vandrer bort, når spindemiderne er spist op. 'Biofyto' fordeles så godt som muligt på de angrebne steder, og der drysses også rovmider ud på ikke angrebne planter. Det kan ikke tilrådes at lægge rovmiderne ud med såmaskine, da de løber ovenud af maskinen på meget kort tid.

Biofyto æder spindemiderne

Spindmiderovmiden 'Biofyto' anvendes til bekæmpelse af væksthus-spindemiden, *Tetranychus urticae*, i væksthus på agurker, tomater, peber, potteplanter, jordbær og hindbær. Den anvendes også på friland til for eksempel arealer med jordbær. 'Biofyto' kan også anvendes til bekæmpelse af beslægtede spindemidearter, f.eks. *Tetranychus cinnabarinus.* 'Biofyto' lever udelukkende af spindemider (alle stadier ædes). Både voksne og ungdomsstadier æder spindemider. 'Biofyto' er meget aktive i deres byttesøgning, og løber rundt på planterne for at finde spindemider. De er også i stand til at lugte sig frem til spindemiderne.

BioProduction® EWH

Den voksne rovmide er rød og ca. 0,3 m. lang. Unge rovmider er hvidlige. Rovmiden gennemfører sin udvikling fra æg til voksen på ca. en uge ved 25 grader. Den voksne hun er i stand til at lægge ca. 50 æg i løbet af 1-2 uger.

Erhvervspakninger:
2.000 rovmider (alle stadier) på bønneblade
2.000 rovmider i vermiculite

Hobbypakninger:
500 rovmider i vermiculite eller på bønneblade.

Insektsæbe

Til bekæmpelse af væksthusspindemider, bladlus, trips, bomuldsmellus og væksthusmellus kan anvendes insektsæbe fra BioProduction. Insektsæben er godkendt af Plantedirektoratet til økologisk dyrkning. Sæben kan anvendes overalt i hus, have, drivhus eller parker. Leveres i beholder med 1 liter
Fås også til erhverv som 10 l eller 200 l. Læs mere og bestil på:
www.bioproduction.dk